

Добавил(а) Wobe
03.12.10 00:52



Если воспалительный процесс развивается в неизменной железе, он рассматривается как тиреоидит. Воспаление, развившееся на фоне ранее существующего зоба, принято называть струмитом. К развитию воспаления более склонна струмозно измененная щитовидная железа.

В клинической практике принята классификация тиреоидитов (струмитов), основанная на особенностях этиопатогенеза и течения:



1. Острый гнойный тиреоидит (струмит).

2. Острый и подострый негнойный тиреоидит (струмит):

- а) подострый гранулематозный тиреоидит Де Кервена;
- б) другие негнойные тиреоидиты.

3. Хронические тиреоидиты:

- а) хронический лимфоматозный тиреоидит (Хасимото);
- б) хронический фиброзный тиреоидит (Риделя);
- в) хронические инфекционные специфические тиреоидиты (туберкулезный, сифилитический).

4. Тиреоидиты, вызванные химическими и физическими агентами:

Добавил(а) Wobe
03.12.10 00:52

а) радиационный тиреоидит;

б) тиреоидит, вызванный химическими веществами (при отравлении свинцом, ртутью, мышьяком).

5. Паразитарные тиреоидиты (болезнь Шагаса, вызванная особым видом трипаносом).